



Interacción genotipo/ambiente y estabilidad del rendimiento en líneas avanzadas de ají Topito (*Capsicum chinense*)*

Genotype/environment interaction and yield stability in advanced lines of Topito pepper

Julio Ernesto Muñoz-Falcon¹, Ender Manuel Correa-Álvarez¹, Rommel Igor León-Pacheco¹, Gabriel Ernesto Silva-Acosta¹, Marlon José Yacomelo-Hernandez¹, Elias David Flórez-Cordero¹

* Recepción: 11 de diciembre, 2023. Aceptación: 21 de marzo, 2024. Este trabajo formó parte del proyecto: F3 Obtención cultivares ajíes ID 1001368, financiado por la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia.

¹ Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – AGROSAVIA, Centro de Investigación Caribia. Km 6 vía Sevilla-Guacamayal, Zona Bananera, Magdalena. 478029 – Colombia. jemunoz@agrosavia.co (<https://orcid.org/0000-0002-1375-2426>); ecorrea@agrosavia.co (<https://orcid.org/0000-0001-7876-5052>); rleon@agrosavia.co (<https://orcid.org/0000-0002-9928-5282>); gesilva@agrosavia.co (<http://orcid.org/0000-0002-6519-8973>); myacomelo@agrosavia.co (<https://orcid.org/0000-0002-5831-5246>); edflores@agrosavia.co (<https://orcid.org/0000-0002-5157-9898>).

Resumen

Introducción. El ají dulce tipo topito (*Capsicum chinense* Jacq, *sinense* Murray) es un cultivo tradicional de la región Caribe de Colombia, el cual ocupa el tercer lugar entre las hortalizas sembradas en esta zona del país. **Objetivo.** Evaluar la interacción genotipo x ambiente y la estabilidad del rendimiento en nueve líneas avanzadas de ají dulce tipo Topito obtenidas en el programa de mejoramiento genético de hortalizas de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA). **Materiales y Métodos.** En el año 2020 se establecieron cuatro ensayos de evaluación agronómica en las localidades de San Pelayo, Córdoba; Sincelejo, Sucre; Suan, Atlántico y Zona Bananera, Magdalena, todas ubicadas en la región caribe de Colombia. Para los experimentos se empleó un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Las variables respuesta fueron: el rendimiento, el número de frutos por planta, el peso fresco del fruto y la longitud del fruto. Se realizaron análisis de estabilidad fenotípica del rendimiento mediante los métodos propuestos por Eberhart y Russell y Lin y Binns. **Resultados.** Hubo interacción genotipo ambiente significativa para variables asociadas al rendimiento de fruto. Mediante el análisis del comportamiento productivo de los materiales en los diferentes ambientes, se pudieron identificar las líneas L61 y L7 como genotipos sobresalientes con rendimientos estadísticamente superiores ($P \leq 0,05$) al testigo regional utilizado y con características de fruto acordes a los requerimientos del mercado de consumo fresco regional. **Conclusiones.** Los genotipos L61 y L7 fueron los que presentaron mejor adaptación a los diferentes ambientes evaluados y mayor potencial productivo, el ambiente Zona Bananera fue donde se alcanzó los mayores rendimientos con 59,11 t ha⁻¹ para L61 y con 55,05 t ha⁻¹ para la línea 7.

Palabras claves: *Capsicum chinense*, fitomejoramiento, selección individual, cultivar.



Abstract

Introduction. The Topito type sweet pepper (*Capsicum chinense* Jacq, *sinense* Murray) is a traditional crop from the Caribbean region of Colombia, which occupies third place among the vegetables cultivated in this area of the country. **Objective.** To evaluate the genotype x environment interaction and yield stability in nine advanced lines of Topito type sweet pepper obtained within the vegetable breeding program of the Colombian Agricultural Research Corporation (AGROSAVIA) **Materials and Methods.** In the year 2020, four agronomic evaluation trials were established in the localities of San Pelayo, Córdoba; Sincelejo, Sucre; Suan, Atlántico and Zona Bananera, Magdalena, all located in the Caribbean region of Colombia. For the experiments, a design of complete blocks at random with four repetitions was carried out. As variables for the answer, the yield, the number of fruits per plant, the fresh weight of the fruit and the length of the fruit are considered. Analysis of phenotypic performance stability will be carried out using the methods proposed by Eberhart and Russell and Lin and Binns. **Results.** The results demonstrated the existence of a significant genotype-environment interaction for variables associated with fruit yield. Through the analysis of the productive behavior of materials in different environments, it was possible to identify the advanced lines L61 and L7 as outstanding genotypes with statistically superior yields ($p \leq 0.05$) in the regional test used and with fruit characteristics according to the requirements of the regional fresh consumption market. **Conclusions.** The L61 and L7 genotypes were the ones that presented the best adaptation to the different environments evaluated and the greatest productive potential, with the Banana Zone environment where the highest yields were achieved with 59.11 t ha⁻¹ for L61 and with 55.05 t ha⁻¹ for line 7.

Keywords: *Capsicum chinense*, plant breeding, individual selection. cultivars.

Introducción

Capsicum L. (Solanaceae) es un género originario del continente americano específicamente de zonas tropicales y templadas en América Central y del Sur, México y las Antillas) incluye 33 especies y 10 variedades o variantes de las cuales cinco han sido domesticadas: *C. annuum* L., *C. baccatum* L., *C. chinense* Jacq., *C. frutescens* L. y *C. pubescens* Ruiz & Pav (Carrizo et al., 2016; Heiser & Smith, 1953; Heiser & Pickersgill, 1969; Pérez-Castañeda et al., 2015). Estas son conocidas como ajíes, chiles o pimientos, y son de importancia para la agricultura por sus diversos usos alimenticios, industriales, medicinales y ornamentales (Srivastava & Mangal, 2019). Además de su importancia económica los ajíes son una fuente importante de vitamina A y C, así como otros compuestos benéficos para la nutrición humana (Olatunji & Afolayan, 2018). En el año 2021, la producción mundial de ajíes fue de 36,2 millones de toneladas producidas en 2 millones de hectáreas, con un rendimiento promedio de 17,6 t ha⁻¹ (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2021). Para el año 2022 ese mismo año, en el Caribe colombiano se sembraron cosecharon 3635 hectáreas con una producción de 25 150 toneladas y rendimientos máximos de 20 t ha⁻¹, lo cual posicionó al ají dulce como la tercera hortaliza con mayor área de siembra de la región (Agronet, 2023).

Las especies cultivadas del género *Capsicum*, entre ellas *C. chinense*, son conocidas por la pungencia de sus frutos, sin embargo, existen muchos tipos de ají que no presentan pungencia, los cuales son denominados ajíes dulces (Laurentin & Quevedo, 2020). La producción de ajíes dulces en la región Caribe de Colombia, obedece al uso de cultivares criollos tipo topito los cuales se caracterizan por frutos de forma triangular que generalmente se comercializan en estado inmaduro (coloración verde) los mismos son destinados al mercado regional por las características organolépticas del producto, las cuales son de gran interés en la preparación de los diferentes platos típicos de la gastronomía costeña y cuya demanda anual sobrepasa las 150 toneladas por año en Granabastos

Barranquilla (Pinto Zapata et al., 2013). El cultivo ha mostrado ser compatible con las condiciones socioeconómicas de los productores de la región caribe de Colombia en términos de unidades productivas con áreas de siembra predominantes de 0,25 ha, generación de empleo (\approx entre 650 – 730 jornales/ha), con rápido retorno económico debido al ciclo vegetativo corto, ciclo productivo prolongado y rentabilidad del cultivo (Correa-Álvarez, et al., 2019; Rúgeles, et al., 2010).

Las interacciones genotipo/ambiente es un factor clave a estudiar en el fitomejoramiento ya que su efecto resulta importante a la hora de seleccionar la estrategia de mejoramiento específica, la interacción entre factores ambientales y el genotipo es común para la mayoría de los rasgos cuantitativos de importancia económica como rendimiento, altura de la planta, peso, etc. (Teressa, et al. 2021). En Colombia se han realizado múltiples estudios sobre la interacción genotipo/ambiente en caracteres productivos de especies de importancia de la familia de la solanáceas como la papa, berenjena o el lulo (León-Pacheco et al., 2020, Medina, et al., 2009), sin embargo no existe información del efecto genotipo/ambiente en cultivares de ají topito.

La productividad del cultivo del ají se puede ver afectada de forma negativa por causas atribuibles al estrés biótico y abiótico, los cuales pueden variar mucho entre regiones (Barchenger et al., 2018). Uno de los objetivos principales de la mayoría de los programas de mejoramiento es desarrollar cultivares con rendimiento y componentes de rendimiento altos y estables. Para esto, los fitomejoradores utilizan la evaluación de genotipos en ensayos en múltiples ambientes como una técnica para determinar la estabilidad de un gran número de cultivares en diferentes ambientes (localidades y años) (León-Pacheco et al., 2020). La idea es reunir la mayor cantidad de información acerca del comportamiento en diversos ambientes con el fin de zonificar su explotación (Carrillo et al., 1991).

Las posiciones relativas entre los genotipos evaluados en diferentes ambientes a menudo difieren entre ellas, por lo que se dificulta la identificación de genotipos deseables (Echandi, 2005; Eberhart & Russell, 1966; Poysa et al., 1986). Los análisis de estabilidad son una herramienta de gran utilidad para los mejoradores puesto que permiten determinar el nivel de adaptación que determinados cultivares o líneas de mejora que puedan presentar a condiciones ambientales favorables, desfavorables, o a ambas (Stoffella et al., 1995). Existen varias metodologías para estimar la estabilidad de cultivares, entre las más usadas se encuentran las propuestas por Eberhart & Russell (1966) y Lin & Binns (1988).

Otro método útil para medir la interacción es basado en la regresión en donde un genotipo es considerado estable si su coeficiente de regresión (β_i) es cercano a uno (1) y las desviaciones de la regresión (S^2d) son próximas a cero (0) (Eberhart & Russell, 1966). El índice de Lin & Binns (P_i) constituye una medida única de la superioridad del comportamiento de un genotipo, definiéndose como el cuadrado medio de la distancia entre la respuesta de un genotipo y el genotipo de máxima respuesta en un ambiente dado. Con esta medida, la máxima respuesta en un ambiente se convierte en el testigo a considerar. La calificación del mejor genotipo es aquel que presente el valor global más bajo y ello, se interpreta como el genotipo más cercano al óptimo a través de los ambientes (Lin & Binns, 1988).

El presente estudio se realizó con la finalidad de evaluar la interacción genotipo x ambiente y la estabilidad del rendimiento en nueve líneas avanzadas de ají dulce tipo Topito obtenidas dentro del programa de mejoramiento genético de hortalizas de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA), en cuatro localidades de la región caribe de Colombia, lo cual contribuirá a la selección de nuevos cultivares con características agronómicas superiores acordes con los requerimientos del productor y del mercado de consumo fresco a nivel regional.

Materiales y métodos

Localización

La investigación se realizó durante el periodo marzo – octubre del 2020 en cuatro localidades de la región Caribe de Colombia, todas correspondientes a la zona de vida bosque seco tropical según la clasificación de Holdridge (Holdridge, 1967) Las evaluaciones fueron realizadas en tres lotes comerciales de agricultores en los departamentos de Atlántico, Córdoba y Sucre, así como una localidad establecida en el Centro de Investigación Caribia de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA) ubicada en el municipio de Zona Bananera, Magdalena (Cuadro 1).

Cuadro 1. Ambientes de la prueba de evaluación agronómica de líneas de ají dulce tipo topito (*Capsicum chinense* Jacq, *sinense* Murray), periodo marzo – octubre de 2020. Subregión Natural Caribe (seco y húmedo) de Colombia.

Table 1. Environments of the agronomic evaluation test of topito type sweet chili lines, period March - October 2020. Caribbean Natural Subregion (Dry and Wet) of Colombia.

AM	LN	LO	Subregión	Alt	TMA	HR	PMA
A1	8°57'03,0''	75°51'05,0''	Caribe húmedo	10 m	27,6°C	81,8 %	1533 mm
A2	9°16'01,0''	75°21'56,0''	Caribe húmedo	202 m	27,1 °C	81,4 %	1325 mm
A3	10°16'56,5''	74°55'48,4''	Caribe seco	7 m	27,9 °C	80,4 %	1141 mm
A4	10°45'52,9''	74°08'55,9''	Caribe seco	20 m	27,5 °C	81,0 %	1260 mm

AM: ambiente; A1: San Pelayo, Córdoba; A2: Sincelejo, Sucre; A3: Suán, Atlántico; A4: Zona Bananera, Magdalena; LN: latitud norte; LO: longitud oeste; Alt: altura sobre el nivel del mar; TMA: temperatura media anual; HR: humedad relativa; PMA: precipitación media anual. / AM: environment; A1: San Pelayo, Córdoba; A2: Sincelejo, Sucre; A3: Suán, Atlántico; A4: Zona Bananera, Magdalena; LN: north latitude; LO: west longitude; Alt: height above sea level; TMA: average annual temperature; RH: relative humidity; PMA: average annual precipitation.

Material vegetal

Se evaluaron un total de nueve líneas avanzadas F₇ de ají dulce tipo topito (*Capsicum chinense* Jacq, *sinense* Murray), obtenidas mediante el método de selección de plantas individuales con prueba de progenie por el Programa de Mejoramiento Genético de Hortalizas de AGROSAVIA, CI Caribia, más un testigo regional que corresponde al cultivar nativo usado por los agricultores, que no ha pasado por ningún proceso de fitomejoramiento sistemático y controlado, y cuya semilla la producen los mismos agricultores (Cuadro 2).

Diseño experimental y establecimiento del ensayo

El ensayo se estableció con un diseño de bloques completos al azar (DBCA), con diez tratamientos (nueve líneas avanzadas de ají dulce tipo topito más un testigo regional) y cuatro repeticiones en cada una de las cuatro localidades. Se utilizó una distancia de siembra de 1 m x 1 m entre surcos y plantas, respectivamente, lo que correspondió a una densidad de siembra de 10 000 plantas/ha. El tamaño de la unidad experimental fue de siete surcos, con cinco plantas por surco para un total de 35 plantas por parcela. Las prácticas agronómicas y de manejo (preparación de suelos, fertilización, manejo de arvenses, plagas y enfermedades) se hicieron de acuerdo con el esquema de cultivo comercial

Cuadro 2. Genealogía de las líneas avanzadas de ají dulce tipo topito (*Capsicum chinense* Jacq, *sinense* Murray), a evaluar en Prueba de Evaluación Agronómica. 2020.

Table 2. Genealogy of the advanced lines of topito-type sweet pepper to be evaluated in the Agronomic Evaluation Test. 2020.

Línea	Tipo	Código de accesión	Selecciones	Método
L7	Topito	AjCo05	AjCo_05: F1(P1)-F2-(P1)-F3(P1)-F4(P1)-F5(P1)-F6(P1)-F7(P1)	Selección de plantas individuales
L17	Topito	AjCo27	AjCo_27: F1(P1)-F2(P1)-F3(P1)-F4(P1)-F5(P1)-F6(P1)-F7(P1)	Selección de plantas individuales
L27	Topito	AjCo50	AjCo_50: F1(P1)-F2(P2)-F3(P1)-F4(P1)-F5(P1)-F6(P1)-F7(P1)	Selección de plantas individuales
L47	Topito	AjCo84	AjCo_84: F1(P1)-F2(P2)-F3(P1)-F4(P1)-F5(P1)-F6(P1)-F7(P1)	Selección de plantas individuales
L50	Topito	AjGu11	AjGu_11: 1(P1)-F2(P2)F3(P1)-F4(P1)-F5(P1)-F6(P1)-F7(P1)	Selección de plantas individuales
L55	Topito	AjSu03	AjSu_03: F1(P1)-F2(P1)-F3(P1)-F4(P1)-F5(P1)-F6(P1)-F7(P1)	Selección de plantas individuales
L61	Topito	AjSu06	AjSu_06: F1(P1)-F2(P1)-F3(P1)-F4(P1)-F5(P1)-F6(P1)-F7(P1)	Selección de plantas individuales
L68	Topito	AjSu11	AjSu_11: F1(P1)-F2(P3)-F3(P1)-F4(P1)-F5(P1)-F6(P1)-F7(P1)	Selección de plantas individuales
L79	Topito	AjMa07	AjMa_07: F1(P1)-F2(P1)- F3(P1)-F4(P1)-F5(P1)-F6(P1)	Selección de plantas individuales
Testigo	Topito	-----	-----	-----

Variables evaluadas

Se recolectaron datos relacionados con las variables de rendimiento como: peso fresco del fruto, número de frutos por planta y longitud del fruto. El rendimiento se estimó a partir de la cosecha de frutos maduros para uso comercial, de todas las plantas que conforman la parcela. Los frutos cosechados se almacenaron en bolsas o canastillas plásticas identificadas con el número de la parcela para luego ser pesadas por parcela en campo o en laboratorio. Se realizó la sumatoria de diez cosechas y se expresó en toneladas por hectárea.

El peso fresco de fruto se evaluó a partir de la primera cosecha. Se tomaron datos individuales de treinta frutos al azar por parcela y se registró el valor promedio. Para cada parcela se realizó un promedio de todas las cosechas y se expresó en gramos. El número de frutos por planta se estimó de manera indirecta a partir de los datos de peso fresco de fruto y peso total de frutos cosechados por parcela con base en los siguientes cálculos: a. Número de frutos por parcela = peso total cosechado por parcela (g) / peso fresco de fruto (g); b. Número de frutos por planta = número de frutos por parcela (#) / número de plantas cosechadas por parcela; c. Sumatoria de las cosechas y se expresó en número.

La longitud de fruto se evaluó en treinta frutos al azar por cada parcela con un pie de rey o vernier digital y se registró el valor promedio. Para cada parcela se realizó un promedio de todas las cosechas y se expresó en centímetros.

Análisis de datos

En cada localidad se realizaron los respectivos análisis de varianza individuales, análisis combinado de varianza y pruebas de separación de medias Tukey al 5% previo a la verificación de los supuestos de la estadística paramétrica de normalidad y homocedasticidad de varianzas. Para los análisis descriptos se empleó el programa estadístico R Studio Versión 4.0.3 (R Core Team, 2020) y Microsoft Excel 365.

Para la variable rendimiento, los análisis de estabilidad fenotípica utilizados fueron los métodos propuestos por Eberhart & Russell (1966) y Lin & Binns (1988). Para ello, se emplearon los programas estadísticos GENES versión 2013.5.1 (Cruz, 2013)

El análisis Eberhart y Russell se realizó de conformidad con la ecuación 1.

$$Y_{ij} = \mu_i + \beta_i I_j + \delta_{ij} + \epsilon_{ij} \quad (1)$$

Donde: Y_{ij} = promedio del genotipo i en el ambiente j , μ_i = media del genotipo i en todos los ambientes, β_i = coeficiente de regresión que mide la respuesta del genotipo i a la variación ambiental, I_j = índice ambiental, obtenido como la diferencia entre la media de todos los genotipos en el ambiente j menos la media general, δ_{ij} = desvío de la regresión del genotipo i en el ambiente j , ϵ_{ij} = la desviación de la regresión de la variedad y el ambiente.

El índice ambiental, en cada ambiente, se calculó por el desvío del promedio de todos los genotipos en ese ambiente, en relación con el promedio general: $I_j = Y_j - Y$.

El índice de Lin y Binns se calculó con la ecuación 2.

$$P_i = \sum_{j=1}^n (X_{ij} - M_j)^2 / 2n \quad (2)$$

Donde: P_i = índice de superioridad de i -ésimo cultivar, X_{ij} = productividad de i -ésimo cultivar evaluado en la j -ésima localidad, M_j = respuesta máxima obtenida entre todos los cultivares en la j -ésima localidad, n = número de localidades.

Las variables respuesta registradas se sometieron a análisis de correlación fenotípica, genética y ambiental con el programa estadístico R Studio Versión 4.0.3. La significancia estadística de la correlación para cada uno de los coeficientes se determinó de acuerdo con Araméndiz et al. (2009), con base en la hipótesis nula: $H_0: r = 0$, versus la hipótesis alterna: $H_a: r \neq 0$, mediante una prueba de 't', y la ecuación 3.

$$t_c = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}} \quad (3)$$

La 't' calculada (t_c) se comparó con una 't' tabla (t_r) al nivel de significancia seleccionado de 0,05 y 0,01 con $n = 2$ grados de libertad. La regla de decisión fue: si $t_c \geq t_r$, entonces el valor de 'r' (correlación) es estadísticamente diferente de cero.

Resultados

Interacción genotipo x ambiente

El análisis combinado de varianzas reveló diferencias altamente significativas ($p < 0,001$) en la interacción G×A para las variables de rendimiento (REN) y número de frutos por planta (NFP) y diferencias significativas ($p < 0,05$) para el peso fresco de fruto (PFF); mientras que la longitud de fruto (LF) mostró diferencias altamente significativas ($p < 0,001$) en los factores ambiente y genotipo. La tabla de separación de medias de la interacción G x A para las variables REN y NFP muestra que los mejores tratamientos correspondieron a las líneas evaluadas en el ambiente Zona Bananera; además, destacan las líneas L61 y L7 por su grupo estadístico y posición ocupada en cada localidad (Cuadro 3 y 4).

Cuadro 3. Valores medios de la interacción G X A para las variables el rendimiento REN ($t\ ha^{-1}$), del cultivo de ají dulce tipo topito (*Capsicum chinense* Jacq, *sinense* Murray). Prueba de Evaluación Agronómica, Subregión natural Caribe. 2020.

Table 3. Mean values of the G X E interaction for the variables, REN yield ($t\ ha^{-1}$), of the topito-type sweet pepper crop. Agronomic Evaluation Test, Caribbean Natural Subregion. 2020.

Genotipo	Zona Bananera		San Pelayo		Sincelejo		Suan	
	Rendimiento ($t\ ha^{-1}$)							
L7	55,05	ab	25,15	G-l	24,38	g-m	18,38	l-q
L17	39,41	de	22,89	G-n	22,79	h-n	14,18	pq
L27	34,50	ef	14,87	O-q	16,17	n-q	14,36	pq
L47	39,83	de	27,05	F-j	27,88	f-i	18,05	l-q
L50	51,57	abc	22,98	G-n	26,32	g-k	17,14	m-q
L55	48,15	bc	17,67	L-q	28,40	f-i	13,13	q
L61	59,11	a	29,30	F-h	30,67	fg	18,90	k-q
L68	48,05	bc	18,30	L-q	21,01	i-p	19,35	j-q
L79	43,90	cd	26,97	F-j	22,58	h-o	20,71	i-q
TEST	45,68	cd	21,56	H-p	22,53	h-o	17,84	l-q
Media	46,53		22,67		24,27		17,20	

Medias con la misma letra son estadísticamente iguales según prueba Tukey ($p \leq 0,05$). Mínima diferencia significativa (DMS): 7,8548. / Means with the same letter are statistically equal according to the Tukey test ($p \leq 0,05$). Minimum significant difference (MSD): 7.8548.

Cuadro 4. Valores medios de la interacción G X A para la variable número de frutos por planta NFP (#), del cultivo de ají dulce tipo topito (*Capsicum chinense* Jacq, *sinense* Murray). Prueba de Evaluación Agronómica, Subregión natural Caribe, 2020.

Table 4. Average values of the G X A interaction for the variable number of fruits per plant NFP (#), of the topito sweet pepper crop. Agronomic Evaluation Test, Caribbean Natural Subregion, 2020.

Genotipo	Numero de frutos por planta (#)							
	Zona Bananera	San Pelayo	Sincelejo	Suan				
L7	2,88 [759,04]	a	2,56 [365,30]	e-l	2,48 [309,66]	h-n	2,56 [365,62]	f-l
L17	2,75 [554,90]	a-e	2,54 [351,53]	g-m	2,50 [326,94]	h-n	2,49 [313,24]	h-n
L27	2,63 [428,82]	c-h	2,33 [214,74]	n	2,32 [212,13]	n	2,45 [287,67]	i-n
L47	2,66 [454,38]	b-h	2,51 [323,67]	h-m	2,52 [334,29]	h-m	2,59 [393,20]	d-j
L50	2,84 [690,07]	ab	2,49 [318,30]	h-n	2,54 [349,46]	g-m	2,58 [384,47]	d-k
L55	2,83 [670,90]	ab	2,37 [236,00]	mn	2,53 [350,01]	h-m	2,48 [303,03]	h-n
L61	2,89 [768,11]	a	2,60 [398,26]	d-j	2,61 [410,80]	d-i	2,72 [530,17]	a-g
L68	2,81 [645,34]	a-c	2,39 [244,79]	l-n	2,44 [285,16]	i-n	2,64 [447,71]	c-h
L79	2,74 [544,01]	a-f	2,53 [338,54]	h-m	2,42 [267,68]	j-n	2,64 [434,26]	c-h
TEST	2,76 [578,49]	a-d	2,49 [311,32]	h-n	2,40 [263,81]	k-n	2,57 [369,42]	e-l

Datos transformados: transformación logarítmica. [medias originales]. / Transformed data: logarithmic transformation. [original means]. Medias con la misma letra son estadísticamente iguales según prueba Tukey ($p \leq 0,05$). / Means with the same letter are statistically equal according to the Tukey test ($p \leq 0,05$).

El rendimiento mostró una amplia variación, obteniéndose valores entre 59,11 t ha⁻¹ para L61 en Zona Bananera hasta 13,13 t ha⁻¹ para L55 en Suan, el mejor ambiente fue Zona Bananera con media general de 46,53 t ha⁻¹, Sincelejo y San Pelayo tuvieron medias generales similares de 24,27 y 22,67 t ha⁻¹, respectivamente; mientras que Suan fue el ambiente de menor potencial productivo con media general de 17,60 t ha⁻¹. La línea L61 obtuvo el primer lugar en rendimiento en las localidades de Zona Bananera, San Pelayo y Sincelejo, mientras que en la localidad de Suan obtuvo la tercera posición, de igual manera las líneas L7 y L50 mostraron los mayores rendimientos en el ambiente Zona Bananera con 55,05 y 51,57 t ha⁻¹, respectivamente. El testigo presentó valores intermedios dentro del grupo evaluado, el cual no alcanzó a estar entre los mejores cinco valores en ninguna de las localidades (Cuadro 3).

Al igual que para el rendimiento, el número de frutos por planta en la localidad de Zona Bananera fue el mejor ambiente con media general de 609 frutos por planta, lo cual está cerca de duplicar las medias generales de los ambientes Sincelejo y San Pelayo que tuvieron medias generales similares entre sí, con 311 y 310 frutos por planta, respectivamente; mientras que Suan fue el segundo mejor ambiente con media general de 383 frutos por planta. Las mejores interacciones fueron de las líneas L61, L7 y L50 en el ambiente Zona Bananera con 768, 759 y 690 frutos por planta, respectivamente (Cuadro 4). El peso fresco del fruto (PFF) presentó medias generales en los ambientes de Sincelejo, Zona Bananera y San Pelayo de 7,90, 7,71 y 7,33 g, respectivamente; mientras que Suan registró una media general de 4,60 g. Para el PFF las mejores interacciones correspondieron a los genotipos L47 en Zona Bananera (8,77 g), L79 (8,56 g) y TEST (8,47 g) en Sincelejo y L47 en San Pelayo con 8,37 g (Cuadro 5).

Cuadro 5. Valores medios de la interacción G X A para la variable peso fresco del fruto (PFF), del cultivo de ají dulce tipo topito (*Capsicum chinense* Jacq, *sinense* Murray). Prueba de Evaluación Agronómica, Subregión natural Caribe. 2020.

Table 5. Mean values of the G X E interaction for the variable fresh weight of the PFF fruit (g), of the topito-type sweet pepper crop. Agronomic Evaluation Test, Caribbean Natural Subregion. 2020.

Genotipo	Zona Bananera		San Pelayo		Sincelejo		Suan	
	Peso fresco del fruto (g)							
L7	7,28	abc	6,90	bcd	7,96	abc	5,11	ef
L17	7,12	abc	6,57	cde	7,15	abc	4,58	f
L27	8,08	abc	6,96	Bc	7,66	abc	5,21	def
L47	8,77	a	8,37	Ab	8,40	ab	4,60	f
L50	7,49	abc	7,34	abc	7,57	abc	4,47	f
L55	7,18	abc	7,46	abc	8,28	abc	4,34	f
L61	7,70	abc	7,39	abc	7,51	abc	3,60	f
L68	7,46	abc	7,47	abc	7,44	abc	4,48	f
L79	8,08	abc	7,98	abc	8,56	ab	4,79	f
TEST	7,93	abc	6,92	bcd	8,47	ab	4,81	f

Medias con la misma letra son estadísticamente iguales según prueba Tukey ($p \leq 0,05$). / Means with the same letter are statistically equal according to the Tukey test ($p \leq 0,05$). Diferencia mínima significativa (DMS): 1,7344 / Means with the same letter are statistically equal according to the Tukey test ($p \leq 0,05$). Minimum significant difference (MSD): 1.7344.

Para la variable longitud de fruto se presenta el análisis para los factores genotipos y ambientes por separados debido a que no hubo diferencias significativas en la interacción G X E. Los mejores ambientes fueron San Pelayo y Zona Bananera con promedios de 5,97 y 5,64 cm, respectivamente (Cuadro 6). Todos los cultivares evaluados, a excepción de la línea L50, superaron los 5 cm de longitud, las líneas L61 y L68 fueron estadísticamente superiores en longitud de fruto con promedios 6,37 y 6,32 cm, respectivamente superó a la línea testigo que presentó valores promedio de 5,80 cm (Cuadro 7).

Cuadro 6. Valores medios de los ambientes para la variable longitud de fruto (cm) del cultivo de ají dulce tipo topito (*Capsicum chinense* Jacq, *sinense* Murray). Prueba de Evaluación Agronómica, Subregión natural Caribe. 2020.

Table 6. Average values of the environments for the variable fruit length (cm) of the topito-type sweet pepper crop. Agronomic Evaluation Test, Caribbean Natural Subregion. 2020.

Ambiente	Longitud de fruto (cm)*		
San Pelayo, Córdoba	0,77	[5,97]	a
Sincelejo, Sucre	0,74	[5,46]	bc
Suan, Atlántico	0,73	[5,35]	c
Zona Bananera, Magdalena	0,75	[5,64]	ab

*Datos transformados: transformación logarítmica. [medias originales]. / *transformed data: logarithmic transformation. [original means].

Medias con la misma letra son estadísticamente iguales según prueba Tukey ($p \leq 0,05$). / Means with the same letter are statistically equal according to the Tukey test ($p \leq 0,05$).

Cuadro 7. Valores medios de los genotipos para la variable longitud de fruto (cm) del cultivo de ají dulce tipo topito (*Capsicum chinense* Jacq, *sinense* Murray). Prueba de Evaluación Agronómica, Subregión natural Caribe. 2020.

Table 7. Mean values of the genotypes for the variable fruit length (cm) of the topito sweet pepper crop. Agronomic Evaluation Test, Caribbean Natural Subregion. 2020.

Genotipo	Longitud de fruto (cm)*		
L61	0,80	[6,37]	a
L68	0,80	[6,32]	a
L27	0,77	[5,88]	b
TESTIGO	0,76	[5,80]	bc
L55	0,74	[5,51]	cd
L79	0,74	[5,48]	cd
L47	0,73	[5,42]	de
L7	0,72	[5,21]	def
L17	0,71	[5,10]	ef
L50	0,70	[4,98]	f

*datos transformados: transformación logarítmica. [medias originales]. / *transformed data: logarithmic transformation. [original means].

Medias con la misma letra son estadísticamente iguales según prueba Tukey ($p \leq 0,05$). / Means with the same letter are statistically equal according to the Tukey test ($p \leq 0,05$).

Análisis de estabilidad fenotípica para el rendimiento

En el análisis de Eberhart y Russel se observó que los genotipos con β_i cercanos a uno fueron TEST, L68, L55, L50 y L17; las líneas con mejor adaptación a ambientes desfavorables fueron TEST, L17 y L79; mientras que las líneas L68, L55 y L50 fueron las de mejor respuesta en ambientes favorables. Además, los genotipos con S^2d próximos a cero (0) fueron TEST, L61, L7 y L50. Acorde a lo anterior, los genotipos más estables fueron el TEST, L61, L7 y L50 (Cuadro 8). Al aplicar el análisis de Lin y Binns (1988), los mejores índices de estabilidad fenotípica general se obtuvieron en las líneas L61, L7, L50 y L79. Las líneas L61, L7, L50 y L55 mostraron los mayores índices de superioridad en ambientes favorables; no obstante, las líneas L61, L47, L7 y L79 fueron las que registraron los mayores índices de superioridad en ambientes desfavorables (Cuadro 8).

De acuerdo con el rendimiento promedio general de las líneas en los ambientes, se pueden clasificar a los ambientes Zona Bananera como favorable (media general de las líneas en el ambiente = 46,5 t ha⁻¹), Sincelejo (22,7 t ha⁻¹) y San Pelayo (24,3 t ha⁻¹) como ambientes promedios y Suan (17,2 t ha⁻¹) como ambiente desfavorable. La línea L61 ocupó el primer lugar para el rendimiento en los ambientes favorables y promedios (Zona Bananera = 59,1 t ha⁻¹ Sincelejo = 30,7 t ha⁻¹ y San Pelayo = 29,3 t ha⁻¹), y el tercer lugar en el ambiente desfavorable (Suan = 18,9 t ha⁻¹); mientras que la línea L7 ocupó el segundo lugar en el ambiente favorable (Zona Bananera = 55,1 t ha⁻¹), la posición cuarta (San Pelayo = 25,1 t ha⁻¹) y quinta (Sincelejo = 24,4 t ha⁻¹) en los ambientes promedios y la cuarta posición (Suan = 18,4 t ha⁻¹) en el ambiente desfavorable (Cuadros 3 y 5). Estos resultados indican que para los genotipos L61 y L17, su alto potencial productivo es una característica genética.

Correlación entre las variables

Los coeficientes de correlación fenotípicas (r_F) y genotípicas (r_G) entre las variables revelan una correlación positiva y altamente significativa entre el rendimiento (REN) y el número de frutos por planta (NFP), mientras que

Cuadro 8. Valores y ranking de estabilidad del rendimiento de diez genotipos de ají dulce tipo topito (*Capsicum chinense* Jacq, *sinense* Murray), en cuatro ambientes del Caribe colombiano. Prueba de Evaluación Agronómica, Subregión natural Caribe. 2020.

Table 8. Values and ranking of yield stability of ten topito sweet chili genotypes in four environments of the Colombian Caribbean. Agronomic Evaluation Test, Caribbean Natural Subregion. 2020.

GEN	REN		Eberhart & Russell				Lin & Binns		
	(t·ha ⁻¹)	βi		S ² d	ME-NP	S ² d/βi	Pi	Pi (+)	Pi (-)
L61	(1) 34,49	1,32	AAF	0,86	ME-NP	0,65 [2]	0,41 [1]	0,0 [1]	0,54 [1]
L7	(2) 30,74	1,27	AAF	0,94	ME-NP	0,75 [3]	9,82 [2]	8,24 [2]	10,34 [3]
L50	(3) 29,50	1,17	AAF	-1,38	BE-P	-1,18 [4]	16,06 [3]	28,44 [3]	11,92 [5]
L79	(4) 28,54	0,78	AAD	6,46	ME-NP	8,22 [7]	37,78 [4]	115,67 [7]	11,81 [4]
L47	(5) 28,20	0,66	AAD	7,81	ME-NP	11,80 [9]	48,93 [8]	185,81 [8]	3,30 [2]
TEST	(6) 26,90	0,97	AAD	-0,53	BE-P	-0,54 [1]	39,35 [5]	90,24 [6]	22,38 [6]
L55	(7) 26,84	1,16	AAF	20,26	ME-NP	17,35 [10]	39,72 [6]	60,06 [4]	32,94 [8]
L68	(8) 26,68	1,07	AAF	12,92	ME-NP	11,99 [9]	42,29 [7]	61,13 [5]	36,00 [9]
L17	(9) 24,82	0,80	AAD	3,13	ME-NP	3,90 [6]	66,73 [9]	194,09 [9]	24,27 [7]
L27	(10) 19,97	0,73	AAD	2,32	ME-NP	3,15 [5]	133,03 [10]	302,82 [10]	76,42 [10]
MG	27,67								

REN: rendimiento; MG: media general; GEN: genotipo. / REN: performance; MG: general average; GEN: genotype.
 βi: coeficiente de regresión; S²d: cuadrado medio de la desviación de la regresión. AAF: adaptación a ambientes favorables; AAD: adaptación a ambientes desfavorables; ME-NP: mala estabilidad y no predecible; BE-P: buena estabilidad y predecible. / βi: regression coefficient; S²d: mean square of the regression deviation. AAF: adaptation to favorable environments; AAD: adaptation to unfavorable environments; ME-NP: poor stability and not predictable; BE-P: good stability and predictable.
 Pi: índice de superioridad general; Pi (+): índice de superioridad en ambientes favorables; P (-): índice de superioridad en ambientes no favorables. / Pi: general superiority index; Pi (+): superiority index in favorable environments; P (-): superiority index in unfavorable environments.
 () Indica el lugar ocupado por el genotipo; []: ranking de estabilidad. / () Indicates the place occupied by the genotype; []: stability ranking.

Cuadro 9. Coeficientes de correlaciones fenotípicas, genéticas y ambientales para las variables asociadas a rendimiento de ají topito (*Capsicum chinense* Jacq, *sinense* Murray), en cuatro ambientes del Caribe colombiano. Prueba de Evaluación Agronómica, Subregión natural Caribe. 2020.

Table 9. Phenotypic, genetic, and environmental correlation coefficients for the variables associated with aji topito yield in four environments of the Colombian Caribbean. Agronomic Evaluation Test, Caribbean Natural Subregion. 2020.

		REN	PFF	NFP
PFF	rF	-0,0932106		
	rG	-0,0811446		
	rA	-0,3063034		
NFP	rF	0,9519580**	-0,3855466	
	rG	0,9591801**	-0,365707	
	rA	0,8608967**	-0,6278209*	
LF	rF	0,0707217	-0,066242	0,1360891
	rG	0,0867643	-0,0965252	0,1675219
	rA	-0,4415264*	0,2312699	-0,5079368*

* , ** : significativo al 5 y 1 %, respectivamente. / * , ** : significant at 5 and 1 %, respectively.
 rF: Correlacione fenotípica, rG: correlación genética, rA: correlación ambiental, REN: rendimiento NFP: número de frutos por planta, PFF: peso fresco del fruto, LF: longitud del fruto. / rF: Phenotypic correlation, rG: genetic correlation, rA: environmental correlation, REN: yield NFP: number of fruits per plant, PFF: fruit fresh weight, LF: fruit length.

para las variables peso fresco del fruto (PFF) y largo del fruto (LF) no se detectaron correlaciones significativas con el rendimiento para la rF y rG (Cuadro 9). Los coeficientes rA entre el par de variables REN con LF, NFP con PFF y LF con NFP mostraron una correlación negativa y significativa, para estos tres casos los valores de rA resultaron ser mayores a los valores de rF y rG lo que implica la existencia de efectos ambientales y/o de los factores no aditivos sobre el nivel real de expresión de la correlación en tales caracteres.

Discusión

Las diferencias significativas encontradas para la interacción G×E para las variables rendimiento, NFP y PF, indican que los cultivares responden de diferente manera a los cambios ambientales, esto concuerda con lo reportado por diferentes autores (Gurung et al., 2012; Rao & Temburne, 2013), los cuales coinciden que variables de tipo cuantitativo como el rendimiento y sus componentes tienen una alta proporción de la varianza asociado al factor ambiental. Esto afianza la necesidad de establecer ensayos en múltiples ambientes que permitan a los fitomejoradores detectar aquellos materiales con mayor potencial de rendimiento. De igual manera Akçura et al. (2005) señalaron que los fitomejoradores necesitan desarrollar genotipos estables que puedan comportarse de manera estable bajo una variedad de condiciones ambientales.

De manera general las líneas de ají topito evaluadas mostraron mayores valores de rendimiento, número de fruto por plantas y peso de fruto en la localidad de Zona Bananera, esto podría ser debido a que esta localidad es el principal ambiente de selección del Programa de Mejoramiento Genético de Hortalizas de AGROSAVIA, CI Caribia y las líneas estén mejor adaptadas a este ambiente, además, al estar ubicado dentro de un centro de investigación el nivel tecnológico aplicado al cuidado del cultivo puede ser superior al de las otras tres locaciones ubicadas en fincas de agricultores, situación similar a esta es reportada por Barchengeret al. (2018) en líneas altamente homocigotas de ají evaluadas en diferentes localidades de Asia, donde los mejores desempeños productivos de las líneas fueron obtenidos en las localidades establecidas en el ambiente de selección del programa de mejoramiento genético.

La no significancia de la interacción G×E para el largo de fruto coincide con lo señalado por Stommel y Griesbach (2008) quienes encontraron que características asociadas a la forma del fruto tienen una alta heredabilidad y una baja influencia del componente ambiental, es por ello que el mercado objetivo debe ser seleccionado al principio del programa de mejoramiento genético, para fijar estos rasgos desde el inicio y poder centrarse en mejorar otras características con alta influencia ambiental, como alto rendimiento, dentro de los tipos de mercados específicos. De acuerdo con sondeos del mercado de consumo fresco de ají dulce tipo topito en la región Caribe de Colombia realizados por AGROSAVIA a consumidores y comercializadores, los parámetros de calidad para peso y longitud de fruto corresponden a ≥ 6 g y ≥ 5 cm, respectivamente (Correa Álvarez, et al., 2013). Estos parámetros fueron aplicados a los procesos de selección de las líneas en el programa de fitomejoramiento. A nivel general, todas las líneas evaluadas cumplieron con este criterio de calidad de fruto.

Cuando se examinó la naturaleza de la interacción genotipo-ambiente, se observaron cambios en el rango del genotipo y diferencias en magnitud, el cambio en el rango de un genotipo entre ambientes disminuye la utilidad de la media de rendimiento por cultivar como único parámetro para medir la estabilidad, por lo que se hace necesario realizar análisis de estabilidad para determinar con mayor grado de certeza esta cualidad. Según Eberhart y Russell (1966) la estabilidad es una característica genética, y los cultivares con amplia adaptación tienen una baja interacción G×A. Sin embargo, cabe aclarar que el concepto de estabilidad aplicado en el mejoramiento de plantas con fines comerciales corresponde al de estabilidad en el sentido agronómico y no al biológico. La estabilidad agronómica se refiere a la capacidad de un determinado genotipo de responder de forma positiva a condiciones ambientales favorables; mientras que la estabilidad biológica hace referencia al comportamiento constante, sin variación, de un genotipo a través de todos los ambientes donde es evaluado (Vallejo & Estrada, 2013). Las líneas L61 y L7, de

acuerdo con los parámetros Eberhart y Russell (S^2d/β_i) y Lin y Binns (P_i), podrían señalarse como genotipos de amplia adaptación de acuerdo con los rendimientos obtenidos por cada uno de ellos en los diferentes ambientes. Sin embargo, seleccionar genotipos en diferentes ambientes con base en el índice de selección no es suficiente, ya que, podríamos incurrir en evaluar el efecto promedio de todos los genotipos en distintas condiciones ambientales, y descartar el efecto individual de algunos ambientes sobre algunos genotipos en particular (León et al., 2021).

En el estudio se usaron diferentes índices de estabilidad que demuestren la superioridad de los genotipos con amplia adaptabilidad, pero también con buen comportamiento en ambientes favorables y desfavorables, respectivamente. Autores como Koundinya et al. (2019), Bhushan y Samnotra (2017) y Mehta et al. (2011), han encontrado comportamientos similares al estudiar la estabilidad de la producción en otras especies pertenecientes a la familia de solanáceas. Esto sugiere que los cultivares se pueden seleccionar para ambientes específicos (Aina et al., 2009) y también discriminar genotipos y ambientes en los análisis de estabilidad que estén correlacionados de forma positiva o negativa. Los resultados obtenidos al aplicar los métodos de estabilidad indican que es posible identificar grupos de genotipos con valores extremos para los índices, lo que permite la selección de genotipos de alto y bajo desempeño a través de los ambientes. En el caso de genotipos que presentan amplia variación en su comportamiento a través de los ambientes, el método no es tan preciso y puede ser necesario considerar relacionar la desviación estándar a través de ambientes para cada genotipo respecto al índice de superioridad estimado (León-Pacheco et al., 2020).

Según el análisis de correlaciones entre las variables estudiadas, el número de frutos por planta fue la única variable correlacionada de manera significativa y positiva con el rendimiento. Esto se debe a que en términos unitarios la principal contribución en el rendimiento de un cultivo, donde el índice de cosecha económico está determinado por el total de acumulación de biomasa en los frutos, se relaciona con el valor escalar de frutos cosechados, más que con su peso individual o con características particulares como su largo o ancho, entre otras (Alemán Pérez et al., 2016; Monge-Pérez et al., 2021). Para el caso de estudio, un mayor número de frutos de ajíes cosechados por planta conllevará a un mayor rendimiento económico final, y correlaciones positivas entre estas variables. Lo anterior concuerda con lo señalado por Barchenger et al. (2018), quienes, al estudiar los componentes de rendimientos de líneas de mejora de ají en diferentes países de Asia, encontraron que el peso de la fruta no se correlaciona de forma significativa con el rendimiento y sugieren que el rendimiento podría estar más influenciado por características como el número de frutos por planta.

Conclusiones

Se observó alta proporción de la varianza asociada al factor ambiental en la expresión de dichas variables, lo que implica la necesidad de establecer ensayos multilocalidad para su estudio.

Las líneas L61 y L7 se identificaron como genotipos sobresalientes por su estabilidad fenotípica en diferentes ambientes de la Costa Colombiana.

Se identificó la Zona Bananera, Sincelejo y San Pelayo como los ambientes con las características edafoclimáticas más favorables para la producción de las líneas ají topito evaluadas, mientras que Suan resultó el ambiente menos favorable para la producción de las mismas.

Agradecimientos

Los autores expresan su agradecimiento a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA) y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por la financiación con fondos públicos al proyecto: F3 Obtención cultivares ajíes ID 1001368 del cual se obtuvo la información que se comparte en este documento.

Referencias

- Alemán Pérez, R. D., Domínguez Brito, J., Rodríguez Guerra, Y., & Soria Re, S. (2016). Indicadores morfológicos y productivos del cultivo del tomate en Invernadero con manejo agroecológico en las condiciones de la Amazonía Ecuatoriana. *Centro Agrícola*, 43(1), 71-76. <http://cagricola.uclv.edu.cu/index.php/es/>
- Agronet. (2021, febrero). Área Cosechada, Producción y Rendimiento de Ají dulce 2007-2021. <https://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/home.aspx?cod=1>
- Aina, O. O., Dixon, A. G. O., Paul, I., & Akinrinde, E. A. (2009). G x E interaction effects on yield and yield components of cassava (landraces and improved) genotypes in the savanna regions of Nigeria. *African Journal of Biotechnology*, 8(19) 4933-4945. <https://www.ajol.info/index.php/ajb/article/view/65189>
- Akçura, M., Kaya, Y., & Taner, S. (2005). Genotype-environment interaction and phenotypic stability analysis for grain yield of durum wheat in the Central Anatolian Region. *Turkish Journal of Agriculture and Forestry*, 29(5), 369-375. https://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/vol29/iss5/5?utm_source=journals.tubitak.gov.tr%2Fagriculture%2Fvol29%2Fiss5%2F5&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
- Araméndiz Tatis, H., Cardona Ayala, C. E., & Espitia Camacho, M. M. (2009). Correlaciones fenotípicas, ambientales y genéticas en berenjena. *Acta Agronómica*, 58(4), 285-291.
- Barchenger, D. W., Clark III, R. A., Gniffke, P. A., Ledesma, D. R., Lin, S., Hanson, P., & Kumar, S. (2018). Stability of yield and yield components of pepper (*Capsicum annuum*), and evaluation of publicly available predictive meteorological data in East and Southeast Asia. *HortScience*, 53(12), 1776-1783. <https://doi.org/10.21273/HORTSCI13581-18>
- Bhushan, A., & Samnotra, R. K. (2017). Stability studies for fruit yield and quality traits in brinjal *Solanum melongena* L. *Indian Journal of Agricultural Research*, 51(4) 375-379. <https://doi.org/10.18805/ijare.v51i04.8426>
- Carrillo, N., Vallejo, F. A., & Estrada, E. I. (1991). Adaptabilidad y estabilidad fenotípica de líneas e híbridos de pimentón, *Capsicum annuum*, L. *Acta Agronómica*, 41(1-4), 21-36. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/29452>
- Carrizo, C., Barfuss, M. H. J., Sehr, E. M., Barboza, G. E., Samuel, R., Moscone, E. A., & Ehrendorfer, F. (2016). Phylogenetic relationships, diversification and expansion of chili peppers (*Capsicum*, Solanaceae). *Annals of Botany*, 118(1), 35-51. <https://doi.org/10.1093/aob/mcw079>
- Correa-Álvarez, E., León-Pacheco, R., Lobato-Ureche, M., García-Davila, M., Muñoz-Perez, C., & Aramendiz-Tatis, H. (2019). Caracterización morfoagronómica de la colección de germoplasma de ají dulce (*Capsicum* spp.) del Caribe colombiano. *Temas Agrarios*, 24(2), 81-95. <https://doi.org/10.21897/rta.v24i2.1998>
- Correa Álvarez, E. M., Jiménez Mass, N., Páez Redondo, A. R., Guzmán Rozo, N., Baquero Maestre, C., & Pinto Zapata, M. J. (2013). *Modelo productivo de ají topito (Capsicum spp.) para la región Caribe*. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. <https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/34309>
- Cruz, C. (2013). *Programa Genes V. 2013, 5.1.-Aplicativo computacional em genética e estatística*. Universidade Federal de Viçosa
- Eberhart, S. A., & Russell, W. A. (1966). Stability parameters for comparing varieties. *Crop Science*, 6(1), 36-40. <https://doi.org/10.2135/cropsci1966.0011183X000600010011x>

- Echandi, C. R. (2005). Estabilidad fenotípica del rendimiento y adaptación en líneas de chile jalapeño (*Capsicum annuum* L.) durante la época lluviosa en Costa Rica. *Agronomía Costarricense*, 29(2), 27-44. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43629203>
- Gurung, T., Techawongstien, S., Suriharn, B., & Techawongstien, S. (2012). Stability analysis of yield and capsaicinoids content in chili (*Capsicum* spp.) grown across six environments. *Euphytica* 187, 11–18. <https://doi.org/10.1007/s10681-012-0672-6>
- Heiser, C. B., & Smith, P. G. (1953). The cultivated *Capsicum* peppers. *Economic Botany*, 7(3), 214-227.
- Heiser, C. B., & Pickersgill, B. (1969). Names for the cultivated species (Solanaceae). *Taxon*, 18(3), 277-283. <https://doi.org/10.2307/1218828>
- Holdridge, L. R. (1967). *Life zone ecology*. Tropical Science Center.
- Mehta, N., Khare, C. P., Dubey, V. K., & Ansari, S. F. (2011). Phenotypic stability for fruit yield and its components in rainy season in brinjal (*Solanum melongena* L.) of Chhattisgarh plains. *Electronic Journal of Plant Breeding*, 2(1), 77-79. <https://www.ejplantbreeding.org/index.php/EJPB/article/view/1665>
- Kottek, M., Grieser, J., Beck, C., Rudolf, B., & Rubel, F. (2006). World map of the Köppen-Geiger climate classification updated. *Meteorologische Zeitschrift*, 15(3), 259-263. https://www.schweizerbart.de/papers/metz/detail/15/55034/World_Map_of_the_Koppen_Geiger_climate_classification_updated.pdf
- Koundinya, A. V. V., Pandit, M. K., Ramesh, D., & Mishra, P. 2019. Phenotypic stability of eggplant for yield and quality through AMMI, GGE and cluster analyses. *Scientia Horticulturae*, 247, 216-223. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.12.019>
- Laurentin, H., & Quevedo, M. (2020). Phenotypic characterization of three Venezuelan sweet pepper (*Capsicum chinense* Jacq.). *Agronomía Mesoamericana*, 31(3), 729–741. <https://doi.org/10.15517/am.v31i3.40302>
- León-Pacheco, R. I., Gómez-Correa, J. C., Cadena-Torres, J., Cantero-Rivero, J. A., Correa-Álvarez, E. M., Espinosa-Carvajal, M. R., Ibáñez-Miranda, K. I., de la Ossa-Albis, V. A., Pérez-Canteros, S. P., & Romero-Ferrer, J. L. (2020). Estabilidad fenotípica de genotipos promisorios de berenjena (*Solanum melongena* L.) para la región Caribe de Colombia. *Acta Agronómica*, 69(3), 188-195.
- León, R., Rosero, A., García, J. L., Morelo, J., Orozco, A., Silva, G, De la Ossa, V., Correa, E., Cordero, C., Villalba, L., Belalcazar, J., & Ceballos, H. (2021). Multi-trait selection indices for identifying new cassava varieties adapted to the Caribbean region of Colombia. *Agronomy*, 11(9), Article 1694. <https://doi.org/10.3390/agronomy11091694>
- Medina, C. I., Lobo, M., & Martínez, E. (2009). Revisión del estado del conocimiento sobre la función productiva del lulo (*Solanum quitoense* Lam.) en Colombia. *Ciencia y Tecnología Agropecuaria*, 10(2), 167-179. https://doi.org/10.21930/rcta.vol10_num2_art:139
- Monge-Pérez, J. E., & Loría-Coto, M. (2021). Determinación de criterios de selección para el rendimiento de tomate (*Solanum lycopersicum* L.) cultivado bajo invernadero. *Avances en Investigación Agropecuaria*, 25(1), 7-19. <https://revistasacademicas.ucol.mx/index.php/agropecuaria/article/view/207>
- Olatunji, T. L., & Afolayan, A. J. (2018). The suitability of chili pepper (*Capsicum annuum* L.) for alleviating human micronutrient dietary deficiencies: A review. *Food Science & Nutrition*, 6(8), 2239–2251. <https://doi.org/10.1002/fsn3.790>

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2021). *FAOSTAT. Datos sobre alimentación y agricultura*. <https://www.fao.org/faostat/es/#home>
- Lin, C. S., & Binns, M. R. (1988). A superiority measure of cultivar performance for cultivar × location data. *Canadian Journal of Plant Science*, 68(1), 193-198. <https://doi.org/10.4141/cjps88-018>
- Pérez-Castañeda, L. M., Castañón-Nájera, G., Ramírez-Meraz, M., & Mayek-Pérez, N. (2015). Avances y perspectivas sobre el estudio, origen y la diversidad genética de *Capsicum* spp. *Ecosistemas y Recursos Agropecuarios*, 2(4), 117-128. <https://doi.org/10.19136/era.a2n4.721>
- Pinto Zapata, M. J., Correa Álvarez, E. M., Jiménez Mass, N., Páez Redondo, A. R., Guzmán Rozo, N., Baquero Maestre, C. (2013). *Modelo productivo del cultivo del ají topito (Capsicum spp.) para la región Caribe*. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. <https://doi.org/10.21930/agrosavia.modeloproductivo.2013.1>
- Poysa, V. W., Garton, R., Courtney, W. H., Metcalf, J. G., & Muehmer, J. (1986). Genotype-environment interactions in processing tomatoes in Ontario. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 111(2), 293-297. <https://doi.org/10.21273/JASHS.111.2.293>
- R Core Team. (2020). *R: The R project for statistical computing* (R version 4.0.3). <https://www.r-project.org/>
- Rao, S. K., & Tembhurne, B. V. (2013). Stability analysis in chilli (*Capsicum annum* L.). *Journal of Spices and Aromatic Crops*, 22(2), 154–164. <https://updatepublishing.com/journal/index.php/josac/article/view/5024>
- Rúgeles, L., Ávila, J., Morales, A., Huertas, A., Guaitero, B., & Bonilla, C. (2010). *Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena de hortalizas en Colombia: salsa de ají*. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. <http://hdl.handle.net/20.500.12324/12660>
- Stoffella P. J., Locascio S. J., Howe T. K., Olson S. M., Shuler K. D., & Vavrina Ch. S. (1995). Yield and fruit size stability differs among bell pepper cultivars. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 120(2), 325-328. <https://doi.org/10.21273/JASHS.120.2.325>
- Stommel, J. R., & Griesbach, R. J. (2008). Inheritance of fruit, foliar, and plant habit attributes in *Capsicum*. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 133(3), 396-407. <https://doi.org/10.21273/JASHS.133.3.396>
- Srivastava, A., & Mangal, M. (2019). *Capsicum Breeding: History and Development*. In N. Ramchiary, & C. Kole (Eds.), *The Capsicum Genome. Compendium of Plant Genomes*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97217-6_3
- Vallejo, F. A., & Estrada, E. I. (2013). *Mejoramiento genético de plantas* (2ª ed.). Universidad Nacional de Colombia sede Palmira.